

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๗/ว ๔๒๐๐



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่น
เลขที่ ๒๖๗๒
วันที่ 11 ต.ค. 2566
เรื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/๒๘๗๔
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ได้ติดตามสถานการณ์โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในช่วงที่ผ่านมาพบการรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคเป็นระยะ ๆ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่า ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดใหญ่ของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังนี้

๑. ขอให้ติดตามการให้วัคซีนแก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดยเร็ว รวมทั้งติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเกณฑ์ สำหรับเด็กนักเรียนขอให้ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.๑ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน และให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ

๒. สื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน โดยพิจารณาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดทำสื่อต้นแบบให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งพิจารณาการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สุนัขอนามัยส่วนบุคคล หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เป็นต้น


๓. เมื่อมีการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด แจ้งพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่มีการระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและตอบโต้การระบาด

๔. ดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มที่มีกพลาดโอกาสการได้รับวัคซีน เช่น เด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น และวางแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกในระดับพื้นที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

/กรมส่งเสริม ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น


กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ โทร. ๐๙-๒๖๑๘-๐๓๗๒

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2566



กำหนดการให้วัคซีนในเด็ก

อายุ	วัคซีนที่ให้	ข้อแนะนำ
แรกเกิด	HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด
	BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)	ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งที่ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 15 สัปดาห์
	OPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	
	Rota1 (วัคซีนโรคตา)	
4 เดือน	DTP-HB-Hib2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)	- ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครั้ง
	OPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	- ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
	IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)	
	Rota2 (วัคซีนโรคตา)	
6 เดือน	DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)	- ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
	OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	- ให้ยกเว้นการได้รับวัคซีนโรคตาครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง
	Rota3 (วัคซีนโรคตา)	
9 เดือน	MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	
1 ปี	LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
1 ปี 6 เดือน	DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)	
	OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	
	MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	
2 ปี 6 เดือน	LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
	DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)	
4 ปี	OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	
	MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	ตรวจสอบประวัติและให้วัคซีนเฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
ประถมศึกษาปีที่ 1	HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	
	LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
	IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)	
	dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)	
	OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	HPV1 และ HPV2 (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี)	- ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน - กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้ฉีดที่อายุ 11-12 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6	dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)	



กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า

ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป		ข้อแนะนำ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	DTP-HB-Hib1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	dT1	ให้วัคซีน IPV เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กนักเรียนชั้น ป.1
		OPV1		OPV1	
		IPV		IPV	
		MMR1		MMR	
2	1	BCG	1	HB1	- ให้ในกรณีที่ไม่มีความรู้พื้นฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีผลเป็น - ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
		OPV2		LAJE1	
		LAJE1		dT2	
3	2	MMR2	2	OPV2	HB2
4	4	DTP-HB-Hib3	7	HB3	
5	12	OPV3	12	OPV3	LAJE 2
		DTP4		dT3	
		LAJE 2		LAJE 2	



กำหนดการให้วัคซีนในผู้ใหญ่⁴

วัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการให้วัคซีน
dT	หญิงตั้งครรภ์	3 ครั้ง หรือตามประวัติการได้รับวัคซีน
	บุคคลอายุ 20, 30, 40...ปี (อายุลงท้ายด้วยเลข 0)	1 ครั้ง ทุก 10 ปี
Influenza	หญิงตั้งครรภ์ (สามารถรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี)	1 ครั้ง ทุกการตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป)
	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ปีละ 1 ครั้ง
	เฉพาะช่วงรณรงค์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ปีละ 1 ครั้ง
	นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1	1 ครั้ง
MR	เฉพาะช่วงรณรงค์ ผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี ได้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 2. บุคลากรทางทหาร/ตำรวจ 3. ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4. กลุ่มวัยแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการ 5. ประชาชนทั่วไป 6. ประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น	1 ครั้ง
	HB	- ให้ 3 ครั้ง (0, 1, 6 เดือน) ในผู้ที่เกิดก่อนปี 2536 - ให้กระตุ้น 1 ครั้ง ในผู้ที่เกิดหลังปี 2536



หมายเหตุ

- วัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่ได้รับตามกำหนด สามารถให้ได้ทันทีเมื่อพบเด็ก
- สำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้าสามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- กรณีพบเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ให้ติดตามเด็กมารับวัคซีนตามกำหนดให้ครบตามกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามกำหนดการให้วัคซีนปกติ
- การบริหารจัดการวัคซีน เป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้และจำนวนวัคซีนคงคลังในแต่ละช่วงเวลา



รายการสื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

จัดทำโดย...กองโรคติดต่อทั่วไป

กรมควบคุมโรค

ลำดับ ที่	ชื่อสื่อเผยแพร่	รูปแบบสื่อเผยแพร่	ช่องทางการสืบค้น
๑	ความรู้เรื่องวัคซีนและกำหนดการให้วัคซีน ปี ๒๕๖๖	โปสเตอร์และ infographic	https://ddc.moph.go.th/dcd/publicshinfodetail.php?publish=๑๓๘๕๗&deptcode=dcd
๒	เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค Vaccine for Everyone	VDO Clip	https://www.youtube.com/watch?v=Et_v๗VctZDw
๓	เชิญชวนผู้ปกครองพาเด็กฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข	VDO Clip	https://www.youtube.com/watch?v=gGTire๐-azE

หมายเหตุ : สามารถติดตามการจัดทำสื่อเผยแพร่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่จะมีการจัดทำเพิ่มเติมได้ทาง <https://ddc.moph.go.th/dcd/>
